

Ao Nascer	BCG / Hepatite B	
1 mês	Hepatite B	
2 meses	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular Hemófilos influenza tipo B Poliomielite inativada	Penta ou Hexa
	Pneumocócica 7-valente conjugada Rotavírus	
3 meses	Meningocócica C conjugada	
4 meses	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular Hemófilos influenza tipo B Poliomielite inativada	Penta
	Pneumocócica 7-valente conjugada Rotavírus	
5 meses	Menincocócica C conjugada	
6 meses	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular Hemófilos influenza tipo B Poliomielite inativada ou Polio oral Hepatite B	Tetra ou Penta ou Hexa
	Pneumocócica 7 valente conjugada	
A partir de 6 meses	Influenza (gripe) (2 doses no primeiro ano)	
A partir de 9 meses	Febre Amarela (residentes e viajantes - áreas endêmicas)	
12 meses	Tríplice viral (Sarampo / Caxumba / Rubéola) Varicela (Catapora) Hepatite A	
13 a 15 meses	Pneumocócica 7-valente (<i>reforço</i>) Meningocócica C conjugada (<i>reforço</i>)	
15 a 18 meses	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular Hemófilos influenza tipo B Poliomielite inativada ou Polio oral	Tetra ou Penta
18 meses	Hepatite A	
4 a 6 anos	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular Poliomielite inativada ou pólio oral	Tríplice acelular
	Tríplice viral (Sarampo / Caxumba / Rubéola) Varicela (Catapora)	
A partir de 11 anos (meninas)	H P V (3 doses)	
14 a 16 anos	Difteria / Tétano / Coqueluche acelular para adultos (Tríplice bacteriana do tipo adulto)	

Crianças menores de 5 anos devem participar das campanhas nacionais de vacinação contra pólio, mesmo que em dia com suas vacinas

