

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO

Recomendações Clínica Núbia Jacó – 2008



| VACINAS | ESQUEMAS |
|--|--|
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | Dose única. |
| | Hepatite A duas doses, com intervalo de seis meses após a primeira. |
| Hepatites A,B ou A,B | Hepatite B três doses: a segunda um mês depois da primeira e a terceira cinco meses depois da segunda. |
| | Hepatite A e B três doses: a segunda um mês depois da primeira e a terceira cinco meses depois da segunda. |
| HPV | Para mulheres na prevenção da infecção pelo papiloma vírus humano: até 26 anos em três doses, no esquema 0-2-6 meses com a vacina do laboratório msd ou até 25 anos em três doses, no esquema 0-1-6 meses com a vacina do laboratório GsK. |
| Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche | Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dtpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e após, uma dose de dt (vacina dupla bacteriana do tipo adulto) a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto ou desconhecido (com menos de três doses anteriores de vacina dt , dtp ou dtpa): completar o esquema de três doses, aplicando uma dose de dtpa e uma ou duas doses de dt |
| Varicela (catapora) | A partir dos 13 anos de idade: duas doses, com intervalo de dois meses. |
| Infuenza (gripe) | Dose única anual. |
| Antipneumocócica 23-valente | Dose única. |
| Meningocócica c conjugada | Dose única. |
| Febre Amarela | Uma dose de dez em dez anos. |