

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OCUPACIONAL

Recomendações Clínica Núbia Jacó – 2008



INDICAÇÕES ESPECIAIS PARA PROFISSIONAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO*

VACINAS ESPECIALMENTE INDICADAS	ESQUEMAS	saúde	alimentos e bebidas	militares, policiais e bombeiros	dejetos e águas contaminadas	crianças	animais	profissionais do sexo	profissionais administrativos	profissionais da aviação	profissionais que viajam muito	manicures e pedicures
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Dose única.	sim	-	sim	-	sim	-	sim	-	sim	sim	-
Hepatites A,B ou A,B	Hepatite A duas doses, com intervalo de seis meses após a primeira.	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	-	sim	sim	-
	Hepatite B três doses, com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda e de cinco meses entre a segunda e a terceira.	sim	-	sim	sim	-	-	sim	-	sim	sim	sim
	Hepatite A e B três doses, com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda e de cinco meses entre a segunda e a terceira.	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	sim	sim	-
HPV	Para mulheres na prevenção da infecção pelo papiloma vírus humano: até 26 anos em três doses, no esquema 0-2-6 meses com a vacina do laboratório msd ou até 25 anos em três doses, no esquema 0-1-6 meses com a vacina do laboratório GsK.	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	Com esquema de vacinação básica completo: reforço com dtpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e após, uma dose de dt (vacina dupla bacteriana do tipo adulto) a cada dez anos.	dtpa	dt	dt	dt	dtpa	dt	-	-	dt	-	dt
	Com esquema de vacinação básica incompleto: uma dose de dtpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e uma ou duas doses de dt (vacina dupla bacteriana do tipo adulto).											
Varicela (catapora)	A partir de 13 anos de idade: duas doses com intervalo de dois meses.	sim	-	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	-
Infuenza (gripe)	Dose única anual.	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Meningococica c conjugada	Dose única.	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Febre Amarela	Uma dose de dez em dez anos.	-	-	sim	-	-	-	-	-	sim	sim	-
Raiva (vacina obtida em cultura de células)	Três doses: a segunda sete dias depois da primeira e a terceira 14 a 21 dias depois da segunda.	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-